

Provincia di Vicenza
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria "N. Strampelli"

Strategia di difesa "a calendario" contro Drosophila suzukii e Rhagoletis cerasi su cv. di ciliegio medio-tardive nel 2017

Suggerimenti validi per i comprensori cerasicoli della Pedemontana e dei Berici - AGGIORNAMENTO del 7 maggio 2017 (vedere sotto)

programma	intervento	principio attivo	prodotti commerciali di riferimento (principali)	efficacia su D. suzukii (moscerino)	efficacia su R. cerasi (mosca)	sequenza in giorni (0 = inizio invaiatura)	giorni di efficacia	parassiti indicati in etichetta	intervallo di sicurezza gg.	Limitazioni
Difesa integrata obbligatoria	1	Acetamiprid	EPIK SL	scarsa	buona	0	4	mosca/drososifila	14	
	2	Fosmet(*) Cyantraniliprole	SPADA 200EC, SUPRAFOS EC EXIREL	buona buona	ottima buona(**)	+ 5	8 10(**)	mosca drososifila	14 7	per Cyantraniliprole: min. 9 gg tra tratt consecutivi
	3	Deltametrina Cyantraniliprole	DECIS EVO, METEOR... EXIREL	buona buona	scarsa buona(**)	+ 14	4 10(**)	mosca drososifila	7	
	4***	Piretro naturale	ASSET ..	buona	scarsa	+ 19	1	afidi/mosca	2	-

Difesa integrata volontaria (vincolante per produzioni IGP Marostica)	1	Acetamiprid	EPIK SL	scarsa	buona	0	4	mosca/drososifila	14	max. 2 trattamenti/anno con neonicotinoidi (Acetamiprid, Imidacloprid, Thiametoxam)
	2	Fosmet(*) Cyantraniliprole	SPADA 200EC, SUPRAFOS EC EXIREL	buona buona	ottima buona(**)	+ 5	8 10(**)	mosca drososifila	14 7	per Fosmet: max 1 trattamento/anno per Cyantraniliprole: min. 9 gg. tra tratt consecutivi
	3	Deltametrina Cyantraniliprole	DECIS EVO, METEOR... EXIREL	buona buona	scarsa buona(**)	+ 14	4 10(**)	mosca drososifila	7	per Deltametrina: max 1 tratt/anno in preraccolta
	4***	Piretro naturale	ASSET ..	buona	scarsa	+ 19	1	afidi/mosca	2	-

Difesa biologica	1	Spinosad	LASER, TRACER 120..	buona	scarsa	0	5	capnode	7	per Spinosad: min. 7 gg tra tratt. consecutivi, max 3 tratt/anno (non più di 2 consecutivi)
	2	Spinosad	LASER, TRACER 120..	buona	scarsa	+ 7	5	capnode	7	
	3	Piretro naturale	ASSET, PYGANIC ..	buona	scarsa	+ 13	1	afidi/mosca	2/7	
	4	Spinosad	LASER, TRACER 120..	buona	scarsa	+ 15	5	capnode	7	

Note

* Fosmet può creare problemi di fitotossicità su alcune cv. (Samba, Lapins, Giorgia ecc.).

** fonte DuPont de Nemours Italia

*** solo nel caso di impiego di Deltametrina nel 3° intervento

NB: Ai 7 maggio i prodotti AUTORIZZATI contro Drosophila suzukii sono: EPIK SL e DECIS EVO. EXIREL è ancora in attesa di autorizzazione per uso di emergenza.

Assicurare la completa ed uniforme bagnatura della vegetazione (senza gocciolamento), utilizzando volumi di acqua e pressioni di esercizio adeguate. In caso di applicazioni a volume ridotto aumentare la concentrazione della miscela al fine di mantenere la stessa dose di prodotto ad ettaro utilizzata nei trattamenti a volume normale.

Le indicazioni fornite in questa strategia sono il frutto di un'analisi ragionata delle esperienze e delle conoscenze disponibili alla data di aggiornamento.

Essa ha il solo scopo di fornire un facile strumento di consultazione a beneficio dei cerasicoltori i quali sono, comunque a tutti gli effetti, i soli responsabili delle scelte dei prodotti da impiegare e delle modalità esecutive degli interventi.

Si raccomanda in ogni caso di fare molta attenzione al rispetto delle indicazioni di etichetta e in particolare ai dosaggi e ai tempi di sicurezza